

Erkrankung	Inkubationszeit	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung	Ärztliches Attest	Geschwisterkinder
Adenoviruskonjunktivitis/ Augenentzündung	5 - 12 Tage	2 Wochen	Symptomfreiheit, kein Jucken und kein Sekret	ja- bei Nachweis von Adenoviren, sonst nein	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
unspezifische Durchfallerkrankungen *2	wenige Stunden bis Tage	Solange Krankheitserreger ausgeschieden werden	24 Stunden symptomfrei bei Kindern bis 6, bei älteren Kindern kein Ausschlussgrund	nein	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
virale und bakterielle Durchfallerkrankungen (z.B. Noro-und Rotaviren, Campylobacter, Yersinien) und bei Erkrankungshäufungen	wenige Stunden bis Tage	Solange Krankheitserreger ausgeschieden werden	48 Stunden symptomfrei bei Kindern bis 6, bei älteren Kindern kein Ausschlussgrund	nein	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
EHEC (HUS Stämme mit Stx.2)/Shigellen	2-10- Tage, gewöhnlich 3-4 Tage	Solange Bakterien im Stuhl nachweisbar	bei STX 1 oder STX 2 negativ-behandeln wie Salmonellen, sonst 2 negative Stuhlkontrollen frühestens 48 Std.nach Genesung	nein, weil Stuhlbefunde vorliegen	Geschwister eine neg. Stuhlprobe, so lange Ausschluss
Hand-Mund-Fuß-Krankheit	4 - 7 Tage	über Speichel und Bläscheninhalt nur in der Akutphase, über den Stuhl einen Monat	nach Eintrocknen der Bläschen	nein	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Hib (Haemophilus-influenzae-Typ-b-Menigitis)	2-4 Tage	24 Std. nach Beginn einer wirksamen Antibiotikabehandlung	klinische Genesung, frühestens 24 Std. nach Antibiotikabehandlung	nein	Überprüfung des Impfschutzes/Chemoprophylaxe empfohlen bei Ungeimpften unter 5 Jahre oder Immunsupprimiert
Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)	2 - 10 Tage	unbehandelt bis zur Abheilung der Wunden	nach 24 Stunden erfolgreicher Therapie, bei noch eiternden Hautveränderungen unter der Therapie erst nach dem Abheilen	Stempel vom Arzt *1	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Keuchhusten	6-20 Tage, meist 9-10 Tage	unbehandelt bis 3 Wochen nach Beginn des Hustens	5 Tage nach Beginn der Antibiotikatherapie oder 3 Wochen nach Beginn des Hustens	Stempel vom Arzt *1	kein Ausschluss wenn kein Husten , wenn Symptome Arztbesuch zur Abklärung, ungeimpfte Haushaltskontakte Chemoprophylaxe empfohlen, geimpfte Haushaltskontakte auch Chemoprophylaxe wenn in Umgebung gefährdete Personen, wie nicht vollständig geimpfte Säuglinge, Kranke oder Schwangere im letzten Trimester
Kopflausbefall	existiert nicht	immer da, solange Betroffenen mit mobilen Läusen noch nicht adäquat behandelt sind	nach sachgerechter Behandlung mit einem zugelassenen Mittel (Apotheke) und sorgfältigem Auskämmen der Nissen	nein, nur im Wiederholungsfall Stempel vom Arzt *1	wenn kein Befall kein Ausschluss sonst auch Behandlung
Ansteckungsfähige Lungentuberkulose	Wochen bis Monate	solange Bakterien im Sputum oder Magensaft nachweisbar sind	mindestens nach 3 negativen Sputumproben, nach klinischem Befund	ja	nach erfolgter Umgebungsuntersuchung durch Gesundheitsamt oder Kinderarzt
Masern	7-21 Tage, gewöhnlich 10-14 Tage	5 Tage vor bis 4 Tage nach Ausschlagbeginn	5 Tage nach Exanthembeginn	Stempel vom Arzt *1	vollständiger Impfschutz oder durchgemachte Erkrankung kein Ausschluss sonst 21 Tage Ausschluss von der GE
Meningokokken-Infektionen	2-10 Tage, gewöhnlich 3-4 Tage	7 Tage vor Symptomen bis 24 Std. nach der Antibiotikabehandlung	nach klinischer Genesung	Stempel vom Arzt *1	24 Std. nach Chemoprophylaxe möglich unabhängig vom Impfstatus

Erkrankung	Inkubationszeit	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung	Ärztliches Attest	Geschwisterkinder
Mumps	12-15 Tage, gewöhnlich 16-18 Tage	7 Tage vor bis 9 Tage nach der Beginn der Schwellung der Ohrspeicheldrüse	Symptomfrei, frühestens 5 Tage nach dem Beginn der Erkrankung	Stempel vom Arzt *1	Durchgemachte Erkrankung, Zulassung von Kontaktpersonen nach Impfstatus, ungeimpfte 18 Tage Ausschluss
Röteln	14 - 21 Tage, gewöhnlich 14-17 Tage	7 Tage vor bis 7 Tage nach dem Ausbruch des Exanthems	nach Abklingen der klinischen Symptome aber frühestens am 8. Tag nach Beginn des Exanthems	Stempel vom Arzt *1	vollständiger Impfschutz oder ärztlich bestätigte durchgemachte Erkrankung, bei ungeimpften 21 Tage nach letztem Kontakt der WG oder Gemeinschaftseinrichtung fern geblieben sind
Ringelröteln	7 - 21 Tage	wenn der Ausschlag auftritt nicht mehr ansteckend	kein Ausschlussgrund, da die Erkrankung in der Regel unbemerkt verläuft, Schwangere in Kitas müssen über das Risiko informiert werden	nein	kein Ausschluss
Scabies (Krätze)	2 - 6 Wochen	bereits vor Symptombeginn und während der gesamten Krankheitsdauer	nach abgeschlossener Behandlung mit einem Antiscabiosum (Herstellerangaben bezüglich der Einwirkzeit beachten), nach Einnahme von Ivermectin (Tablette) 24 Std. abwarten	Stempel vom Arzt *1	möglichst zeitgleich mit behandeln
Scharlach oder sonstige Streptococcus-pyogenes- Infektionen (Streptokokken- Angina)	1 - 3 Tage	3 Wochen unbehandelt, 24 Std. nach Antibiotikatherapie	24 Std. nach Antibiotikatherapie, ohne antibiotische Therapie frühestens nach 24 Std. nach Abklingen der spezifischen Symptome	Stempel vom Arzt *1	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Salmonellose	6 - 72 Std.	bis zu 7 Wochen Ausscheidungsdauer	48 Std. Symptomfreiheit, Absprache der Hygienemaßnahmen mit Gemeinschaftseinrichtung	Stempel vom Arzt *1	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Virushepatitis E	15-64 Tage	unklar, 1 Woche vor bis 4 Wochen nach Ikterus, bei chron. Infektion solange die Infektion besteht	nach klinischer Genesung unter Beachtung der Händehygiene	Stempel vom Arzt *1	kein Ausschluss bei Wahrung guter persönlicher Hygiene
Virushepatitis A	15 - 50 Tage	1 - 2 Wochen vor Ikterus (Gelbfärbung) 1 Woche nach Ikterus	2 Wochen nach Erkrankungsbeginn, 1 Woche nach Auftreten der Gelbfärbung, bei Kleinkindern Hygienekompetenz beachten	Stempel vom Arzt *1	Immunität durch Impfung od. durchgemachter Erkrankung/Riegelungsimpfung erhalten und 2 Wochen der GE ferngeblieben/oder 30 Tage ohne Riegelungsimpfung der GE ferngeblieben
Windpocken	8-28 Tage, gewöhnlich 14-16 Tage	1 - 2 Tage vor Auftreten des Exanthems bis 5 - 7 Tage nach Exanthem (bis zum vollständigen Verkrusten der Bläschen)	1 Woche nach Auftreten der Bläschen und deren vollständigem Verkrusten	Stempel vom Arzt *1	kein Ausschluss wenn vor 2004 in DE geboren, vollständig geimpft bzw. nach Rücksprache mit Gesundheitsamt

*1 es handelt sich um eine Empfehlung

*2 mindestens 3 flüssige Stühle